

# Concheatomi

## - Du skal opereres i næsen

### Oplysning inden operationen

Du skal have lavet en operation som hedder conchatomi.

Operationen laves for at give mere luft i næsen.

Concha kaldes også næsemuslingerne. Vi har tre i hvert næsebor, hvor den nederste er den største.

Concha er en bøjet knogle som stikker frem fra siden i dine næsebor, og som er omgivet af en slimhinde. ("Huden" i din næse). Slimhinden kan hæve så meget, på især den nederste concha, at det giver besvær med at trække vejret gennem næsen.

Ved at operere på dine conchae, vil man opnå, at de bliver mindre, og giver bedre luft i næsen. Dette resultat opnås hos de fleste, men desværre ikke hos alle.

### Inden operationen

Inden operationen bedes du oplyse, om der er noget medicin, du ikke kan tåle, samt om du tager blodfortyndende medicin.

### Selve operationen

Inden operationen vil du få noget bedøvende vat i næsen. Herefter vil du blive yderligere lokalbedøvet ved en

lille indsprøjtning i næsen.

Så foretages operationen, hvor man efter et lille snit, skraber under slimhinden, og til sidst giver knoglen et lille knæk, for at give bedre plads.

Du kan hele tiden mærke, at du bliver rørt ved, men næsen er bedøvet, så du mærker ingen smerte.

Til sidst får du lagt noget gaze op i næsen for at undgå blødning. Denne gaze skal du gå med til dagen efter, hvor det vil blive fjernet her på klinikken.

### Efter operationen

Hvis der er smerter efter operationen, kan de normalt klares med Panodil.

Hvis det begynder at bløde, efter du er kommet hjem, skal du først prøve at sutte på noget is. Hvis det fortsætter med at bløde, må du kontakte lægevagten på tlf. 70150300

Efter operationen kan der godt gå en måned, inden du kan mærke en forskel, fra før operationen.

### Risiko ved operationen

Udover risiko for blødning anses operationen ikke at være forbundet med nogen speciel risiko. ■